

- **A kukorica legfontosabb kórokozói**

- Kukorica csíkos mozaik
- Kukorica-peronoszpóra (USA-ban, Indiában jelentős)
- Golyvás üszög
- Rostos üszög (rezisztensek a hibridek)
- Kukoricarozsda
- Makrofominás szárkorhadás és hervadás (aszályos időszakban)
- Szemfoltbetegség
- Nigrospórás szárazkorhadás
- Kukorica helmintosporózisai (USA-ban komoly járványok!)
- Kukorica fuzáriózis (Csávázás! Buvisild, Vitavax)

- **A kukorica legfontosabb kártevői**

- Kukoricagyökértetű
- Levéltetvek
- Talajlakó kártevők
- Barkók
- Földibolhák
- Kukoricabogár
- Kukoricamoly
- Gyapottok-bagolylepke
- Fritlégy
- Vetési varjú

- **Amerikai kukoricabogár**

- **Kárképe:** A lárvák a támasztógyökeret rágják és befúrnak a központi edénynyalábhoz, a növény kidől. (hattyúnyak) Az imágó a bibeszálakat rágja. (hiányos termékenyülés)
- **Biológiája:** 1 nemzedékes tojás alakban telel.
- **Védekezés:** Vetésváltás! Talajfertőtlenítőkkel és, vagy állománykezeléssel. Rovarölőszeres csávázással csak gyéríteni lehet.

- **Kukoricamoly**

- **Kárképe:** Az első nemzedék lárvái a címerbe rágnak (A címer letörik). Lefelé haladva rágnak a szárban. A második nemzedék lárvái a csövekbe is behatolnak ott a szemeket rágják.
- **Biológiája:** A hernyó telel át a kukorica szárában. A főrajzás júniusban-július első felében van. A második nemzedék augusztus-szeptember első felében rajzik.
- **Védekezés:** Fénycsapdával és szexferomoncsapdával előre-jelezhető. A kukoricaszárát május 15-ig meg kell semmisíteni. (A kender is gazdanövény!) Állománykezelés.

